

SANGUINAMENTI ACUTI E CRONICI

Il riscontro di sangue nelle feci in età pediatrica è un evento relativamente frequente che richiede un attento inquadramento diagnostico.

In una prima fase il pediatra curante attraverso un'attenta anamnesi ed un esame obiettivo accurato, comprensivo dell'esplorazione della regione ano-rettale, può facilitare e accelerare l'iter diagnostico.

Quando il sanguinamento proviene dal tratto digestivo superiore solo in 1/3 dei casi è presente una melena ed in meno del 10% ematochezia.

Al contrario, quando la provenienza è dal tratto digestivo inferiore l'ematochezia rappresenta circa l'80% delle condizioni.

Se l'esame obiettivo e l'anamnesi non consentono una diagnosi precisa, è possibile esplorare accuratamente l'apparato digestivo con tecniche moderne e sicure come l'endoscopia digestiva e la videocapsula pediatrica per lo studio del tenue.

Il sanguinamento gastrointestinale è una patologia di grosso rilievo in età pediatrica e spesso si tratta di un'emergenza medica, con alta morbilità e a volte anche causa di decesso. Presenta inoltre alti costi di ospedalizzazione.

Alcuni aspetti diagnostici e terapeutici sono molto simili ad equivalente patologia dell'adulto, ma il più delle volte sono presenti differenze significative nella fase diagnostica e della terapia.